

THRIPOR-L

Orius laevigatus



Producto

Orius laevigatus (chinche depredador)

Presentación: botella de 100 ml

Contenido: 2000 adultos y ninfas mezclados con alforfón y un poco de vermiculita

Objetivo

Varias especies de trips (larvas y adultos). En la ausencia de trips, Orius puede vivir a base de polen.

Dosis

Las siguientes instrucciones solo tienen un carácter indicativo. Para poder ofrecer un asesoramiento a medida se deberán de tener en cuenta factores locales, tales como el cultivo, las condiciones climáticas y el grado de infestación de la plaga. Para obtener un resultado óptimo, consulte siempre al especialista de Koppert o a un distribuidor de productos Koppert autorizado.

THRIPOR-L	dosis	m ² /unidad	intervalo (días)	frecuencia	observaciones
preventiva	1/2/m ²	4000	14	2x	sólo en cultivos con polen
curativa baja	1/m ²	2000	14	2x	-
curativa alta	10/m ²	200	-	1x	sólo en áreas afectadas

Introducción

- Invertir y agitar suavemente la botella antes de usar
- Repartir el contenido sobre un saco de lana de roca, hojas o en las cajas de aplicación (Dibox)
- En grupos de 75-100 individuos para favorecer los apareamientos para poder controlar la reproducción
- Asegurarse de que el material permanece unos días en su lugar de introducción

Almacenamiento y embalaje

Debido a que los productos de control biológico tienen un ciclo de vida (muy) corto, se deberán introducir en el cultivo lo antes posible tras su recepción. Su almacenamiento puede afectar a la calidad y solo debe tener lugar bajo las condiciones abajo indicadas. Koppert B.V. no se responsabiliza de la pérdida de calidad derivada de un almacenamiento más largo del producto y/o bajo unas condiciones inadecuadas.

- Almacenamiento tras la recepción: 1-2 días
- Temperatura de almacenamiento: 8-10°C
- A oscuras (botella horizontal)

Observaciones

Orius pone una gran proporción de huevos en tallos (laterales). Introducir THRIPOR directamente después de podar para evitar una pérdida innecesaria de huevos.

Morfología

- Adultos: color negro, manchas color gris/blanco/marrón en las alas tamaño: 1,4-2,4 mm
- Huevos: apenas visibles, embebidos en el tejido de la hoja
- Ninfas jóvenes: amarillas
- Ninfas viejas: amarillas con manchas marrón amarillentas

Modo de acción

Los adultos y ninfas perforan con su aparato bucal larvas y adultos de trips y succionan su contenido.

Efecto visual

Los trips se arrugan tras ser comidos por Orius, y por lo tanto es difícil verlos por el cultivo.

¡Importante!

Únicamente use productos que estén permitidos en su país/estado y cultivo. Revise los requisitos de registro fitosanitarios de su país.

Koppert Biological Systems no puede responsabilizarse de un uso no autorizado.

[Efectos secundarios THRIPOR-L](#)